

enim satis sua sponte, è maioribus in minores ramulas intrudi, è massa & fonte separari, aut è locis calidioribus in frigidiora migrare; verisimilius est) Sed omnino valvulæ factæ sunt, ne à venis magnis in minores moueretur sanguis & sic illas dilaceraret, aut variocosas efficeret, neue à centro corporis in extrema: sed potius ab extremitatibus ad centrum progredederetur, ita huic motui valvulæ tenues facile recluduntur, cōtra ium omnino supprimunt, & sic positæ & ordinatæ vt si quid per cornua superiorum minus prohiberetur transitu, sed quasi per rimas elaberetur conuexitas subsequantium transuersim posita exciperet, & sisteret ne ulterius transiret.

Ego illud sæpiissime in dissectione venarum expertus sum, si à radice venarum initio facto, versus exiles venarum ramos Spicillum mitterem (quanto potuerim artificio) ob impedimentum valvularum longius impellere, non potuisset: contra vero forinsecus è ramulis radicem versus facillime, & pluribus in locis valvulæ binæ ad inuicem ita positæ, & aptatæ, vt ad amissum (dum eleuantur) in media venæ cauitate cohæreant & vniantur, extremitatibus conuexis inuicem; vt neque visu, cernere, neque satis explorare rimulam aut coitum liceret, contra vero forinsecus intro immisso stylo cedunt, & (valvularum, quibus cursus fluminum inhibentur in morem) facillime reclinantur, vt motum sanguinis profectum à corde, & vena caua intercipient, & ad amissum pluribus in locis eleuati inuicem dum clauduntur, omnino inhibeant & supprimant, & siue sursum ad caput, siue deorsum ad pedes, siue ad latera brachii sanguinem à corde moueri (ita sunt constitutæ) vt nusquam sinant, sed motui omni sanguinis qui à maioribus venis auspicatus, in minores desinat, aduersentur & obsistant: ei vero qui à venis exilibus incipiens in maiores desinat, obsecundent liberamque & patentem viam expendant.

Sed quo veritas hæc apertius elucescat; ligetur brachium supra cubitum viuo homine, tanquam ad mittendum sanguinem A A per interualla apparebunt, præcipue in rusticis & varicosis, tanquam modi quidam & tubercula B. C. D. D. E. F. non solum vbi est diuaticatio E. F. sed etiam vbi nulla [C. D.] & isti nodi à valvulis fiunt. Hoc modo apparentibus in exteriori parte manus vel cubiti si à nodo inferius pollice vel digito comprimendo sanguinem, & de nodo illo siue valvula detraxeris] H. 2. figur. [videbis nullum (inhibente omnino valvula) subsequi posse & venæ portionem (H. O. secundæ fig.) infra tuberculum & digi-

& digitum detractum, ob valvulam, satis distentam [K. tertiæ,] nulla vi cogis, quanto maiori conatu, hoc [O. tertiæ] vel tuberculum tamen inferius vacuum efficitur.

Hoc, cum pluribus in officium in venis idem esse, rificio aortæ & venæ arteriæ sim claudantur, ne retro si-

Præterea ligato brachio tuberculum aliquod siue vti-um [L. quartæ] & postea [N.] digito [M.] compuleris debis [L. N.] nec retro pedæ] ablato vero digito [H. C.] vt hinc sursum ab inferius moueri in venis & non contra in locis valvulæ quæ non solum valvula est, transitum impedire; tamen vt plurimum diligentius fieri visum est, illi vel frequentia vel diligentia næ viæ patentibus & apertæ si- te vero à corde omnino occurrat vt prius brachio & venis tu- viuo homine, infra aliquan- neris; pollicem, qui venam sanguinis progrediatur & tione, sursum supra valvula lato digito [L.] finito rursum appresso pollice, idem idem & hoc millies in breui tem-

Iam si rem supputaueris valvulam supponendo, &